

284 Abejaruco común



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Macho (07-V).

ABEJARUCO COMÚN (*Merops apiaster*)

IDENTIFICACIÓN

27-29 cm. Píleo y parte anterior del dorso castaño-rojizo; espalda amarillo dorado; cola y partes inferiores verdes; garganta amarilla y ojos cubiertos por una banda negra; pico negro y curvado; alas verdosas; par de plumas centrales de la cola más largas que las demás. **Juveniles** más pálidos y con par de plumas centrales igual de largas que las demás.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Macho con las grandes, medianas y pequeñas coberteras centrales de color castaño en ambas barbas de la pluma; espalda castaño-rojizo.

Hembra sin color castaño en el ala o con la mancha más reducida (generalmente limitada a grandes y medianas coberteras); las grandes coberteras centrales tienen castaño en la barba externa, orlada a veces por una línea verde, siendo la barba interna verdosa; espalda de color castaño-verdoso (**CUIDADO:** existen ejemplares intermedios que no se pueden sexar; en **verano**, después de la muda **post-nupcial**, las plumas del cuerpo de ambos sexos tienden a ser verdosas. Es posible sexar los ejemplares **juveniles** extremos: **macho** con capirote y nuca castaños; espalda ante dorado; coberteras centrales del ala y secundarias teñidas de ante; **hembra** con capirote y nuca verdosos; espalda verdosa; coberteras centrales del ala verde apagado.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con las plumas de la nuca, dorso y coberteras alares verdosas, sin o con muy poco castaño; plumas centrales de la cola de la misma longitud que las demás; iris marrón.

2º año con el plumaje de adulto (incluido el par alargado de plumas de la cola), pero se reconocen por las coberteras primarias azuladas que contrastan con el color verdoso de las plumas vecinas (este carácter es útil para determinar la edad hasta el otoño, teniendo entonces las coberteras primarias desgastadas y marrones).

Adultos con las plumas de la nuca y dorso castañas; plumas centrales de la cola de mayor longitud que las demás; coberteras primarias de color verdoso sin contraste con las plumas vecinas; iris rojizo.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa, comenzando entre julio y octubre y terminadas en los cuarteles de invernada, adquiriendo un plumaje de eclipse. Entre febrero-marzo tienen una muda **prenupcial** que abarca plumas corporales y coberteras del ala, adquiriendo el plumaje nupcial.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Es una especie estival repartida por todo Aragón, faltando como reproductora en las partes más altas de los sistemas montañosos y lugares muy áridos del Valle del Ebro.



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Hembra (09-V).


284 Abejaruco común



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Macho (07-V).





Abejaruco común. Primavera. 2º año. Hembra (07-V).





Abejaruco común. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (07-V); abajo hembra (09-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (07-V); abajo hembra (09-V).



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Diseño del capriote: izquierda macho (07-V); derecha hembra (09-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Diseño del capriote: izquierda macho (07-V); derecha hembra (09-V).




Abejaruco común. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (07-V); derecha hembra (09-V).


284 Abejaruco común



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (07-V); derecha hembra (07-V).




Abejaruco. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (07-V); derecha hembra (09-V).



Abejaruco. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (07-V); derecha hembra (09-V).



Abejaruco. Primavera. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (07-V); derecha hembra (07-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (07-V); derecha hembra (07-V).



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (07-V).



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (09-V).

284 Abejaruco común



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (07-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias (07-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (07-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias (07-V).



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias (07-V).



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Macho: diseño de secundarias y coberteras (07-V).



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (09-V).

284 Abejaruco común



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de secundarias y coberteras (09-V).



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (07-V).



Abejaruco común. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (09-V).




Abejaruco común. Primavera. 2º año. Macho: diseño de secundarias y coberteras (07-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (07-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de secundarias y coberteras (07-V).



Abejaruco común. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (07-V).

284 Abejaruco común



Abejaruco común. Verano. Adulto. Macho (20-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Macho (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Hembra (16-VIII).




Abejaruco común. Verano. 2º año. Macho (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (20-VIII); abajo hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Hembra (16-VIII).




Abejaruco común. Verano. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-VIII); abajo hembra (16-VIII).



284 Abejaruco común



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-VIII); abajo hembra (16-VIII).





Abejaruco común. Verano. Juvenil. Diseño del capirote: izquierda macho (16-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (20-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (20-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Diseño del capirote: izquierda macho (16-VIII); derecha hembra (16-VIII).




Abejaruco común. Verano. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (16-VIII); derecha hembra (16-VIII).

284 Abejaruco común



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (16-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (16-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (20-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (16-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (20-VIII); derecha hembra (16-VIII).

284 Abejaruco común



Abejaruco común. Verano. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (16-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Macho: diseño de coberteras primarias (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Hembra: diseño de coberteras primarias (16-VIII).

Abejaruco común. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (16-VIII); derecha hembra (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Macho: diseño de coberteras primarias (16-VIII).

Abejaruco común. Verano. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (20-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Hembra: diseño de coberteras primarias (16-VIII).

Abejaruco común. Verano. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias (16-VIII).

284 Abejaruco común



Abejaruco común. Verano. Adulto. Macho: diseño de primarias (20-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Macho: diseño de primarias (16-VIII).




Abejaruco común. Verano. Adulto. Hembra: diseño de primarias (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Hembra: diseño de primarias (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Macho: diseño de primarias (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Macho: diseño de secundarias y coberteras (20-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Hembra: diseño de primarias (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Hembra: diseño de secundarias y coberteras (16-VIII).


284 Abejaruco común



Abejaruco común. Verano. 2º año. Macho: diseño de secundarias y coberteras (16-VIII).




Abejaruco común. Verano. Juvenil. Hembra: diseño de secundarias y coberteras (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Hembra: diseño de secundarias y coberteras (16-VIII).




Abejaruco común. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (20-VIII).



Abejaruco común. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Macho: diseño de secundarias y coberteras (16-VIII).




Abejaruco común. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala (16-VIII).

284 Abejaruco común



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Macho: diseño del ala (16-VIII).



Abejaruco común. Verano. Juvenil. Hembra: diseño del ala (16-VIII).